

# KEDİ ve KÖPEKLERDE PİYOMETRA OPERASYONLARDA ANESTEZİ PROTOKOLÜ

Dr. Öğr. Üyesi  
Damla Tuğçe OKUR




- ANESTEZİ
- SEZARYEN OPERASYONUNDA ANESTEZİ  
PROTOKOLLERİ
- PİYOMETRA OPERASYONUNDA ANESTEZİ  
PROTOKOLLERİ
- OVERİOHİSTEREKTOMİ OPERASYONUNDA  
ANESTEZİ PROTOKOLLERİ



# ANESTEZİ

Anestezi = An (Olumsuzluk) + Estezi (Duyu,His)



# ANESTEZİNİN AMACI

1- KOLAY müdahale etme imkanı

2- Hekim ve yardımcılarının GÜVENLİĞİ



# PIYOMETRA



# PİYOMETRALI HAYVANLARDA

- Böbrek yetmezliği




Kan üre  
Kreatinin  
Pankreatik amilaz



- Hepatik işlev bozukluğu



Alkalin fosfotaz (ALP)  
Aspartal aminotransferaz (AST)  
Alanin aminotransferaz (ALT)



- Kardiyak aritmi



# ANESTEZİ PROTOKOLÜ

HASTANIN DURUMUNA GÖRE

STABİL

KARDİYAK DEPRESYON

ARİTMİLİ

YOĞUN SEPTİSEMİ

AGONİ



# STABİL HASTALARDA

Dehidrasyon, şok, anemi

PREMEDİKASYON

✓ OPIOİDLER



Oksimorfon  
Hidromorfon  
Fentanil

✓ BENZODİAZEPAN



Diazepam  
midazolam

✓ FENOTAZİNLER




Asepromazin





# STABİL HASTALARDA



Propofol

Etomidat

İnhalasyon ajanları



# STABİL OLMAYAN HASTALAR

PREMEDİKASYON

ANALJEZİ

Oksimorfin

Butorfenal

Buprenorfin



# STABİL OLMAYAN HASTALAR

ENTÜBASYON

EVET

HAYIR


OPIOİD  
BENZODİAZEPİN

ETOMİDAT



# STABİL OLMAYAN HASTALAR

ETOMİDAT BULUNMADIĞI DURUMLARDA



✓ Düşük dozlarda tiyopental sodyum veya propofol



# STABİL HASTALARDA İDEAL ANESTEZİ PROTOKOLÜ

## PREMEDİKASYON

- Butorfanol (0,2-0,4 mg / kg)
- Oksimorfin (0.05-0.1 mg/kg)
- Morphine (0.1–0.2 mg/kg)

## İNDÜKSİYON

- Propofol (2-6 mg/kg)
- Tiyopental (7-10 mg/kg)
- Etomidat (0.15-0.3 mg/kg)

## DEVAMI

- İzofluran, sevofluran (%0.5-2)

## PREMEDİKASYON

- Butorfanol (0,2-0,4 mg / kg)

## İNDÜKSİYON

- Tiyopental (7-10 mg/kg)
- Propofol (2-6 mg/kg)

## DEVAMI

- İzofluran (%0.5-2)



# STABİL OLMAYAN HASTALARDA İDEAL ANESTEZİ PROTOKOLÜ

## PREMEDİKASYON

- Butorfanol (0,2-0,4 mg / kg)
- Oksimorfin (0.05-0.1 mg/kg)
- Morphine (0.1–0.2 mg/kg)

## İNDÜKSİYON

- Propofol (2-6 mg/kg)
- Etomidat (0.15-0.3 mg/kg)
- Midazolam (0.1-0.2 mg/kg)

## DEVAMI

- İzofluran, sevofluran (%0.5-2)

## ANALJEZİ İÇİN

- Butorfanol (0,2-0,4 mg / kg)

## İNDÜKSİYON

- Propofol (2-6 mg/kg)

## DEVAMI

- İzofluran (%0.5-2)

